



Ficha Técnica

Safebalm® es la nueva generación de fluido conservador elaborado gracias a la investigación sobre el *PREVENTOL P--100 (Bronopol)* como agente biosida.

Safebalm® es un producto cuya función consiste en desinfectar y en preservar a un difunto con el fin de retrasar y de ralentizar su descomposición.

La particularidad de **Safebalm®** respecto a los productos utilizados a base de formaldehído es su capacidad para mantener los tejidos flexibles.

Las dosificaciones recomendadas corresponden a una conservación eficaz del difunto de entre 6 y 10 días.

No obstante, concentrando la cantidad de producto inyectado, se puede lograr una conservación más duradera, útil en caso de repatriación.

Descripción del Producto

Arterial: fluido de color naranja inodoro.

Cavity : fluido incoloro e inodoro.

Procedimiento de utilización de Safebalm® Arterial y Cavity

Durante la realización del tratamiento con el producto **Safebalm®** se recomienda seguir las siguientes pautas:

Inyección intraarterial Safebalm® Arterial:

Se recomienda inyectar al menos 7 litros de solución (preparación terminada).

La utilización de productos de preinyección y/o de coinyección sin formaldehído no altera la eficacia del producto.

Recomendamos una dosis mínima del 5% y máxima del 7.5%.

Es conveniente verter siempre primero el fluido concentrado Arterial y posteriormente mezclarlo con agua fría.

Se recomienda respetar las dosificaciones para evitar que el cuerpo adquiriera un aspecto grisáceo.



Circunstancias particulares:

En caso de que se produzca por lo menos una de las siguientes circunstancias:

- Gran corpulencia del difunto.
- Difunto recién fallecido
- Larga exposición

En estas condiciones, será conveniente inyectar dos recipientes de 4,5 litros de manera idéntica con el fin:

- de proceder a una mayor difusión de la inyección, permitiendo un mejor drenaje de los líquidos fisiológicos
- de evitar una deshidratación rápida
- de aumentar el poder neutralizador del producto

Inyección Safebalm® Cavity:

- Inyección de 200 ml de **Safebalm®** Cavity en el tórax (en capas intercaladas).
- Inyección de 300 ml de **Safebalm®** Cavity en el abdomen (en capas intercaladas).

Precauciones de uso

Durante la manipulación del fluido, es obligatorio llevar los equipos de protección individual:



Una máscara FFP2 es suficiente con este producto.

Almacenamiento del producto en un lugar seco protegido del frío y de las altas temperaturas.

Respetar la dosificación y las fechas de utilización.

Puede consultar y descargar las Fichas técnicas en www.safebalm.com

Transporte de Materiales peligrosos

Safebalm® es un producto clasificado como material peligroso, UN 2929 o UN 2927. Éste debe ser objeto de atención particular para su transporte. En los vehículos, hay que respetar siempre el embalaje doble, el etiquetado de la botella y la caja de cartón de materiales peligrosos.

Una vez vacía, la botella no puede depositarse en los contenedores de desechos domésticos. Ésta tendrá que tratarse como residuo de actividad con riesgo de infección o como residuo químico. Si la transporta en su propio vehículo, debe ir dentro de la caja destinada a materiales peligrosos.