



Technische fiche

Safebalm® is de nieuwe generatie conserveringsvloeistof die tot stand kwam dankzij het onderzoek op *PREVENTOL P-100 (Bronopol)* als kiemdodend middel.

Safebalm® is een product met als doel de overledene te desinfecteren en te conserveren, om het ontbindingsproces te vertragen.

De bijzondere eigenschap van **Safebalm®** -vergeleken met de producten op basis van formaldehyde- zorgt ervoor dat de weefsels soepel blijven.

De voorschreven dosering is bedoeld voor een doeltreffende conservering van de overledene gedurende 6 tot 10 dagen.

Door de hoeveelheid ingespoten vloeistof aan te passen, kan een echter een langere conservering verkregen worden (voor van repatriëring van het lichaam).

Beschrijving van het product

Arterial: geurloze oranje vloeistof.

Cavity : geurloze en kleurloze vloeistof.

Gebruik van **Safebalm®Arterial** en **Cavity**

Bij gebruik van **Safebalm®** moet de volgende procedure gevolgd worden:

intra-arteriële injectie van **Safebalm®Arterial:**

Er moet ten minste 7 liter oplossing ingespoten worden (klaargemaakte bereiding). Het gebruik van producten voor pre- en/of co-injectie zonder formaldehyde, verandert niets aan de prestaties van het product.

De aanbevolen dosering is een minimum van 5% en een maximum van 7.5%

Eerst moet de geconcentreerde Arterial-vloeistof ingegoten worden en daarna koud water toegevoegd worden.

Het wordt sterkaanbevolen om de dosering te respecteren, om te vermijden dat het lichaam grijs wordt.



Bijzondere omstandigheden (in het geval van tenminste één van de volgende situaties):

- Sterk overgewicht van de overledene.
- Overledene recent overleden.
- Lange opbaring

In bovenstaande omstandigheden is het beter om twee bokalen van 4,5 liter op identieke wijze in te spuiten om:

- meer ingespoten vloeistof te verspreiden om een betere drainage van de fysiologische vloeistoffen toe te laten
- een snelle dehydratatie te vermijden
- het neutraliserend vermogen van het product te verbeteren

Injectie Safebalm® Cavity:

- Verspreiding van 200 ml **Safebalm®** Cavity in de thorax (in op elkaar liggende lagen).
- Verspreiding van 300 ml **Safebalm®** Cavity in de abdomen (in op elkaar liggende lagen).

Gebruiksvoorzorgen

Bij het manipuleren van de vloeistof is het dragen van beschermende kleding verplicht:



Een FFP2-masker volstaat voor dit product.

Het product bewaren op een droge plaats, beschut tegen vors en grote hitte. De dosering en de gebruiksdata respecteren.

De SDS kunnen geraadpleegd en gedownload worden op www.safebalm.com

Transport van gevaarlijke stoffen

Safebalm® is een product dat tot de klasse van de gevaarlijke stoffen behoort (UN 2929 of UN 2927). Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het transport ervan. In voertuigen moet steeds de dubbele verpakking in een gelabelde fles en een kartonnen doos voor gevaarlijke stoffen, gerespecteerd worden. Een lege fles mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar bij het afval van verzorgingsinstellingen met infectierisico of verwerkt worden als chemisch afval. Als u de fles weer in uw voertuig zet, moet ze opnieuw in de kartonnen doos voor gevaarlijke stoffen worden verpakt.